

KARTA OSTRZEGAWCZA DLA PACJENTA

Dabigatran etexilate Accord

75 mg, 110 mg, 150 mg
kapsułki twarde

- **Pacjent/opiekun powinien nosić kartę zawsze przy sobie**
- **Należy upewnić się, że jest to ostatnia wersja (04/07/2023)**

Szanowny Pacjencie, Szanowny Opiekunie dziecka,

Lekarz zalecił Pani/Panu lub dziecku stosowanie leku Dabigatran etexilate Accord.

Aby bezpiecznie stosować lek Dabigatran etexilate Accord, należy zapoznać się z istotnymi informacjami w ulotce dla pacjenta.

Karta zawiera ważne informacje dotyczące leczenia Pani/-a lub dziecka, należy nosić ją zawsze przy pacjencie i zawsze informować lekarza, że Pani/Pan lub dziecko przyjmuje lek Dabigatran etexilate Accord.

Dabigatran etexilate Accord Informacje dla pacjenta / opiekuna dziecka

Informacje dotyczące leczenia Pani/Pana lub dziecka

- Lek Dabigatran etexilate Accord rozrzedza krew. Jest stosowany w leczeniu istniejących zakrzepów krwi lub w zapobieganiu tworzeniu się niebezpiecznych zakrzepów krwi.
- Podczas przyjmowania leku Dabigatran etexilate Accord należy przestrzegać zaleceń lekarza. Nigdy nie należy pomijać dawki leku ani nie przerywać przyjmowania leku Dabigatran etexilate Accord bez konsultacji z lekarzem.
- Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie przez Panią/-a lub dziecko.
- Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Dabigatran etexilate Accord przed wszelkimi zabiegami chirurgicznymi / procedurami inwazyjnymi.
- Kapsułki Dabigatran etexilate Accord można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Kapsulek nie wolno kruszyć ani przeżuwać oraz nie wolno wysypywać peletek z kapsułki.

Kiedy zasięgnąć porady lekarskiej

- Przyjmowanie leku Dabigatran etexilate Accord może zwiększać ryzyko krwawienia. Należy natychmiast zwrócić się do lekarza w przypadku wystąpienia u Pani/-a lub dziecka objawów krwawienia, takich jak: obrzęk, uczucie dyskomfortu, nietypowy ból lub ból głowy, zawroty głowy, błądź, osłabienie, nietypowe zasinienie, krwotoki z nosa, krwawienie z dziąseł, nietypowe długie krwawienie z miejsca skaleczenia, nieprawidłowe krwawienie miesięczne lub krwawienie z pochwy, obecność krwi w moczu, który może być koloru różowego lub brązowego, czerwone / czarne stolce, kaszel z krwią, wymioty krwawe lub fusowate.
- W razie upadku lub urazu, zwłaszcza urazu głowy, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza po poradę.
- Nie przerywać przyjmowania leku Dabigatran etexilate Accord bez konsultacji z lekarzem w przypadku wystąpienia u Pani/-a lub dziecka zgagi, nudności, wymiotów, uczucia dyskomfortu w żołądku, wzdęć lub bólu w nadbrzuszu.

Dabigatran etexilate Accord Informacje dla fachowego personelu medycznego

- Dabigatran etexilate Accord to doustny lek przeciwzakrzepowy (bezpośredni inhibitor trombiny).
- Może zaistnieć konieczność odstawienia leku Dabigatran etexilate Accord odpowiednio wcześniej przed zabiegami chirurgicznymi lub innymi procedurami inwazyjnymi.
- W przypadku poważnego krwawienia lek Dabigatran etexilate Accord należy odstawić natychmiast.
- Dla dorosłych pacjentów dostępny jest swoisty czynnik odwracający (idarucyzumab). Nie określono skuteczności ani bezpieczeństwa stosowania swoistego czynnika odwracającego, idarucyzumabu u dzieci i młodzieży.
- W celu uzyskania szczegółowych informacji i porad dotyczących odwracania działania przeciwzakrzepowego leku Dabigatran etexilate Accord należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego.
- Lek Dabigatran etexilate Accord jest wydalany głównie przez nerki; konieczne jest picie odpowiedniej ilości płynów. Lek Dabigatran etexilate Accord może być usuwany w drodze dializy.

Należy wypełnić tę część lub zwrócić się do lekarza prowadzącego Panią/Pana lub Pani/Pana dziecko z prośbą o jej wypełnienie.

DANE PACJENTA:

Imię i nazwisko pacjenta

Data urodzenia

Wskazania do leczenia przeciwzakrzepowego

Dawka leku Dabigatran etexilate Accord
